



NAPA VASCULAR
&
VEIN CENTER

Flebectomía ambulatoria incisiva – Postcirugía

Acaba de someterse a una flebectomía mediante microincisiones. *Es posible que se haya combinado con Cierre con Radiofrecuencia VNUS y, si es así, se le brindará información por separado sobre ese tratamiento.*

Por el resto del día, su nivel de actividad debe ser mínimo. Permanezca recostado con su tobillo a la altura o ligeramente por encima del nivel del corazón. Puede levantarse para ir al baño o para comer, pero intente estar recostado con su pierna hacia el resto del tiempo. Mañana ya podrá levantarse y volver a sus actividades normales pero, si es posible, evite el ejercicio pesado por otras 72 horas.

Su pierna está vendada con una venda elástica que debe usar durante 24 horas, transcurrido ese tiempo puede quitársela para bañarse. Cambie la venda después de bañarse y siga usándola hasta que regrese a Napa Vascular & Vein Center para su ultrasonido de control (si fue programado). Si no tiene programado un ultrasonido de control, utilice la venda elástica durante 48 horas más.

Sentirá algunas molestias leves, moretones o hinchazón en las zonas tratadas. Esta molestia desaparecerá gradualmente en las próximas semanas. Para calmar el dolor, es suficiente tomar ibuprofeno o paracetamol. Es probable que tome algunos meses observar una mejora estética definitiva. Le garantizamos que estará satisfecha con los resultados finales.

El Dr. Brooks volverá a revisar su(s) pierna(s) en un mes y le recomendará algunos tratamientos adicionales con inyecciones. A veces, es necesario retirar la sangre coagulada y esto también es una intervención menor. Estos "retoques" nos ayudan a obtener el resultado final más satisfactorio.

Queremos que este proceso sea lo más fácil y agradable posible para usted. Generalmente, se necesitan varias visitas al consultorio, ya que casi siempre, el tratamiento de várices es un proceso de varios pasos. Si tiene alguna pregunta llámenos al **707-252-4955**.

www.napavascular.com